

## MACROGOL ADULTS 3350

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η χρήση σε παιδιά πρέπει να πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη.

Το προϊόν μπορεί να μειώσει τον χρόνο της εντερικής διέλευσης και, επομένως, την απορρόφηση φαρμάκων που χορηγούνται από του στόματος. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η λήψη του **FREZYDERM MACROGOL 3350 Adults** σε χρονική απόσταση τουλάχιστον 2 ωρών από άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται από του στόματος.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε το FREZYDERM MACROGOL 3350 Adults σε περίπτωση:

- Γνωστής υπερευαισθησίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά
- Παραλυτικού ειλεού
- Εντερικής διάτρησης, απόφραξης ή στένωσης
- Σοβαρής φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (π.χ. ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, τοξικό megacolon)

Τα καθαρτικά αντενδείκνυνται σε οξύ κοιλιακό άλγος, κοιλιακό άλγος άγνωστης αιτιολογίας, ναυτία και έμετο, αιμορραγία από το ορθό άγνωστης αιτιολογίας ή σε περίπτωση σοβαρής αφυδάτωσης.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορούν να προκύψουν αντιδράσεις που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα (κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, κοιλιακή διάταση, ναυτία, ακράτεια κοπράνων). Η διάρροια αποτελεί συνέπεια της λήψης υπερβολικής δόσης **FREZYDERM MACROGOL 3350 Adults** και ανταποκρίνεται στη μείωση της δόσης. Σπάνια έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας (δερματικό εξάνθημα) ως αποτέλεσμα της χρήσης προϊόντων που περιέχουν μακρογόλη. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη θεραπεία και συμβουλευτείτε τον ιατρό.