

## MACROGOL KIDS 3350

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε παιδιά αφού συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Η χρήση σε παιδιά πρέπει να πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.

Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη.

Το προϊόν μπορεί να μειώσει τον χρόνο της εντερικής διέλευσης και, επομένως, την απορρόφηση φαρμάκων που χορηγούνται από του στόματος. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται από του στόματος, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται σε χρονική απόσταση τουλάχιστον 2 ωρών από τη λήψη του **FREZYDERM MACROGOL 3350 Kids**.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε το **FREZYDERM MACROGOL 3350 Kids** σε περίπτωση:

- Γνωστής υπερευαισθησίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά
- Παραλυτικού ειλεού
- Εντερικής διάτρησης, απόφραξης ή στένωσης
- Σοβαρής φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (π.χ. ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, τοξικό megacolon)

Η χρήση καθαρικών αντενδείκνυται σε οξύ κοιλιακό άλγος, κοιλιακό άλγος άγνωστης αιτιολογίας, ναυτία και έμετο, αιμορραγία από το ορθό άγνωστης αιτιολογίας ή σε περίπτωση σοβαρής αφυδάτωσης.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να εμφανιστούν ορισμένες γαστρεντερικές διαταραχές (κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, κοιλιακή διάταση, ναυτία, ακράτεια κοπράνων). Η διάρροια αποτελεί συνέπεια της λήψης υπερβολικής δόσης **FREZYDERM MACROGOL 3350 Kids** και μπορεί να αποφευχθεί μειώνοντας τη δόση πρόσληψης.

Σπάνια έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας (δερματικό εξάνθημα) ως αποτέλεσμα της χρήσης προϊόντων που περιέχουν μακρογόλη. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.